

Fiche de totem : Kowari



Floches

Extérieur : Brun clair

Intérieur : Roy

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Mammifères

Ordre : Dasyuromorphia

Famille : Dasyuroide

Caractéristiques

Taille : 16-18 cm

Poids : 70-140 g

Longévité : /

Portée : 5-6

Gestation : 32 jours

Protection : Inconnu



Le Kowari est de 16.5-18 centimètres de long avec une queue de 13-14 centimètre. Son régime consiste principalement en insectes et araignées, mais également de petits lézards, oiseaux ou rongeurs. On le connaît comme prédateur vorace. De plus, il n'a pas besoin de boire; sa nourriture lui apportant l'eau dont il a besoin. Il vit sous terre, seul ou dans de petits groupes. Il émerge pour chasser parmi des touffes d'herbe pour la nourriture. Il se reproduit en hiver, à partir de Mai-Octobre, et donne naissance aux portées de 5-6 jeunes après une gestation de 32 jours.

Le Kowari est coloré cendré-gris, et son dispositif de distinction est la brosse des poils noirs sur l'extrémité de sa queue, qui diffère de ceux trouvées dans mulgaras (*Dasyercus*) parce qu'ils encerclent complètement l'extrémité de la queue.

Le Kowari est trouvé dans des secteurs pierreux de désert de Lac Eyre bassin de drainage, dans nord-est L'australie du sud et du sud-ouest Le Queensland. À l'ouest de lac Eyre il diminue, et est maintenant probablement éteint dans ce secteur.