

Fiche de totem : Junco



Floches

Extérieur : Orange

Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement : Vertébré

Classe : Oiseau

Ordre : Passériforme

Famille : Emberzidé

Caractéristiques

Taille : 14 à 16 cm

Poids : 18 à 30 grammes

Longévité :

Portée : 3 à 6 oeufs

Gestation :

Protection : Espèce Protégée



Le junco ardoisé est un passereau svelte et de petite taille. Le mâle adulte présente une tête, des parties supérieures, une gorge, une poitrine et des flancs entièrement gris-ardoise, parfois avec une légère nuance brune sur le manteau. Les ailes sont noirâtres avec des liserés grisâtres particulièrement visibles sur les grandes couvertures et sur les tertiaires. La queue est noirâtre avec les rectrices extérieures entièrement ou partiellement blanches. Le ventre et les sous-caudales sont blancs, contrastant avec les flancs et la poitrine gris-ardoise. L'iris est brun sombre, le bec rose clair. Les pattes sont brun sombre ou chair grisâtre. Pendant toute l'année, le plumage ne subit aucune modification mais la pointe du bec peut être légèrement plus sombre en dehors de la période nuptiale. Chez la femelle, le plumage affiche les mêmes motifs mais le capuchon et les parties supérieures sont gris plus pâle. Le manteau affiche une nuance nettement plus brune. Les liserés des ailes sont également plus bruns, en particulier sur les tertiaires. La queue présente moins de blanc.

Comportement : Lorsqu'ils se déplacent sur le sol, les juncos ardoisés courent ou sautillent. Ils peuvent parcourir une distance de 30 cm en un seul bond. Ils se projettent parfois brusquement en avant quand ils veulent chasser un rival ou capturer une proie en mouvement. En automne et pendant la saison hivernale, les juncos ardoisés sont très grégaires. Ils forment alors des petites bandes dont les effectifs varient de 15 à 25 individus. Assez couramment, les bandes de juncos ardoisés se mêlent à celles des bruants hudsoniens (*Spizella arborea*). Ces bandes se constituent au petit matin, 25 à 30 minutes avant le lever du soleil. Elles se désagrègent en soirée, environ 45 minutes avant la tombée de la nuit, lorsque les oiseaux regagnent leurs perchoirs pour se reposer. Pendant la journée, les activités se réduisent au perchage et à la recherche de nourriture. Le temps accordé à chacune de ces occupations varie selon la saison et en fonction de l'importance prise par la nidification. En été, les juncos quêtent leurs aliments en moyenne pendant 4 heures et demi par jour, alors qu'en hiver, compte tenu de besoins énergétiques plus importants, ils y passent environ 6 heures.

Sources : <http://www.oiseaux.net/oiseaux/junco.ardoise.html>

