

Fiche de totem : Aluco



Floches

Extérieur : Orange
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement : Chordé

Classe : Oiseau

Ordre : Strigiforme

Famille : Strigidé

Caractéristiques

Taille : 37 à 39 cm

Poids : 420 à 590 grammes

Longévité : 18 ans

Portée : 2 à 4 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu



Surnommée également Aluco, la hulotte est la plus connue des rapaces nocturnes.

Chant : L'Aluco a un vaste répertoire de cris, et on note quelques variations entre les deux. Le premier est un hullement tremblotant au cours duquel des monosyllabes faibles alternent avec des pauses. Le second est un doux trémolo qui baisse en tonalité.

Pendant les parades amoureuses, elle émet des trilles longs, mais aussi des cris de contentement. Le cri aigu est plutôt entendu au printemps et en été, quand l'oiseau est excité ou agressif.

Habitat : L'Aluco fréquente les forêts et les bois ouverts ou semi-ouverts, les cultures, les villages et les villes, habituellement n'importe quelle zone avec des arbres.

Cette espèce se trouve depuis la bordure de la zone boréale, à travers les régions tempérées jusqu'à la méditerranéenne. On la voit surtout dans les plaines, mais selon la distribution, elle peut être présente à haute altitude en Turquie et au Turkestan, et même jusqu'à 4250 mètres dans l'Himalaya où elle habite les derniers arbres.

Comportements : Très sensible, la lumière l'éblouit. Peut-être très agressive si on la dérangement. C'est un terrible chasseur, surtout dans la totale obscurité.

On peut parfois la surprendre posée sur une branche à se chauffer au soleil.

L'Aluco se nourrit principalement de petits mammifères tels que souris, musaraignes et campagnols. Elle peut atteindre la taille d'un écureuil ou d'un jeune lapin. Des petits oiseaux jusqu'à la taille du merle, les vers, escargots et insectes sont également pris selon l'endroit et la disponibilité des proies.

Elle chasse la nuit, entre le crépuscule et l'aube, mais elle peut occasionnellement être active de jour. Elle se perche sur un perchoir et localise les proies grâce à l'ouïe. Elle effectue des vols courts et rapides. Elle laisse tomber sur la proie et ouvre ses ailes au moment de l'impact pour couvrir la proie et éviter le bruit. Elle chasse plus souvent en forêt, mais également dans les jardins des villes. C'est un prédateur nocturne. Elle s'adapte principalement à son ouïe très développée pour le repérage de ses proies, quasi-exclusivement la nuit. Elle ne coule pas du soleil jusqu'avant son lever.

Lorsqu'elle chasse au-dessus des zones découvertes, elle vole lentement, effectue quelques vols stationnaires et cherche ses proies en volant en zigzag.

Il lui arrive de prendre quelques poissons à la surface de l'eau tout en volant. Elle est capable de capturer les chauves-souris en vol.

La proie est consommée sur un perchoir élevé. Comme les autres Strigidés, la Chouette conserve dans son estomac les parties non digérées comme les os, les dents, la fourrure, les plumes...

Le mâle effectue des vols territoriaux pour établir le territoire tandis que la femelle choisit le nid. Les comportements agressifs commencent en octobre-novembre. Ensuite, juste après l'établissement du nid, les deux partenaires dorment souvent ensemble.

Le mâle offre de la nourriture à la femelle. Quelques parades le montrent posé près de sa partenaire, d'un côté à l'autre mais aussi de bas en haut. Il relève d'abord une aile, puis l'autre, et ensuite les deux.

Au cours d'autres parades, le mâle gonfle son plumage, ce qui le fait apparaître presque entièrement blanc. Les coups d'ailes et se lance à la poursuite de la femelle qui gonfle également son plumage et fait vibrer ses plumes.

Vol : Elle vole avec des battements doux et silencieux alternant avec des glissés courts.



Totems-Scouts.be
L'Encyclopédie des Totems Scouts

Nidification : Nid : Situé dans un trou d'arbre, un vieux nid d'écureuil ou de corneille, parfois d'un rocher, voire un terrier de lapin. Ponte : La femelle pond de 2 à 4 oeufs blancs et ronds dans la cavité en mars ou avril, parfois dès février. La femelle, ravitaillée par le mâle couve de 12 à 14 jours. Les jeunes sont élevés au nid par la femelle, tandis que le mâle chasse seul au début, pour toute la famille. Ils sortent du nid bout de 5 à 6 semaines.

Régime : Petits mammifères : mulots, musaraignes, souris, campagnols. Mais aussi hérissons, escargots, mollusques et insectes. Après ce festin dame hulotte régurgite le tout en pelote de réjection.

Source : Oiseaux.net