

# Fiche de totem : Athÿna



## Floches

**Extérieur :** Gris clair

**Intérieur :** Brun foncé

## Classification

**Sous-Embranchement :** Verticilliformes

**Classe :** Aves

**Ordre :** Strigiformes

**Famille :** Strigidiformes

## Caractéristiques

**Taille :** 20 cm

**Poids :** 200g

**Longévité :** 9 ans

**Portée :**

**Gestation :**

**Protection :** Inconnu



Appelÿe ÿgalement Chevÿche d'Atthÿna ou simplement Athÿne.

**Chant :** Le cri de la chevÿche d'Athÿna est un "verro" retentissant et criard. On peut aussi entendre son chant, un miaulement net et clair. La femelle ÿmet des sons plus haut-perchÿs et nasillards. Le cri d'alarme est perchÿsant et aigu.

**Habitat :** L'Athÿna vit dans des zones plates ou vallonnÿes de toutes sortes, les zones agricoles, les paysages avec des arbres dispersÿs, des terrains ouverts traversÿs de talus, murs de pierres ou pentes rocheuses. On les trouve aussi dans les vergers, les ruines, les villages, le semi-dÿsert ou le dÿsert.

Cette espÿce est rÿsidente dans les zones tempÿrÿes et chaudes de son territoire.

Elle frÿquente plusieurs sortes d'habitats ouverts tels que les steppes, les semi-dÿserts pierreux, les zones cultivÿes, les forÿts ouvertes avec des arbres clairsemÿs, les ravins, les carriÿres,

En revanche, cette espÿce ÿvite la vÿgÿtation trop ÿpaisse. ÿ

**Comportements :** L'Athÿna est active de jour comme de nuit, mais elle chasse plutÿt la nuit, ÿ l'aube et au crÿpuscule. Pendant le jour, elle est souvent perchÿe ÿ dÿcouvert sur des pylÿnes ou des arbres. Ses proies les plus frÿquentes sont les insectes et les araignÿes, les souris et les campagnols.

Quand elle chasse, elle effectue un vol rapide et direct, et se laisse tomber sur sa proie pour la capturer. Elle l'emporte ensuite dans une cavitÿ d'arbre pour la dÿvorer. Elle a des serres puissantes, et est capable d'empoigner des petits mammifÿres et oiseaux de sa propre taille. Elle peut aussi voltiger sur place pour attraper des insectes.

L'Athÿna peut rester posÿe pendant des heures complÿtement immobile.

Elle rejette de petites pelotes depuis son perchoir favori, dortoir ou nid. Ces pelotes ovales s'accumulent sur le sol, sous ces perchoirs.

Elle est souvent vue posÿe, soit bien dressÿe sur ses pattes, soit accroupie sur les piquets, clÿtures, fils, rochers. Quand elle se sent menacÿe ou qu'elle est excitÿe, elle reste debout bien droite et se balance en mouvements rapides.

Cette espÿce se nourrit surtout de petits mammifÿres et d'oiseaux, mais aussi d'amphibiens, reptiles et grands insectes. Elle consomme aussi des matiÿres vÿgÿtales telles qu'herbes, feuilles, petits fruits et baies. ÿ

Elle chasse principalement au crÿpuscule et ÿ l'aube, mais aussi pendant les premiÿres heures de la nuit. Elle chasse habituellement depuis un perchoir et fond sur sa proie en vol direct quand celle-ci est repÿrÿe.

Elle peut aussi chasser sur le sol. Grÿce ÿ ses pattes assez longues, elle est capable de courir facilement et de poursuivre ses proies.

L'Athÿna est monogame et les liens du couple durent toute l'annÿe et souvent plus longtemps. ÿ

La parade typique du mâle offrant de la nourriture ÿ la femelle est frÿquente, tandis que la femelle ÿmet des petits cris comme les jeunes oiseaux. Pendant ces parades, le mâle bouge habituellement les ailes et le corps avant de s'accoupler. Le lissage mutuel des plumes joue aussi un rÿle important pour renforcer les liens du couple. Les deux partenaires ÿmettent des cris tandis que le mâle se rapproche de la femelle petit ÿ petit. Le mâle ÿtablit son territoire dÿbut fÿvrier en lanÿant son cri familier ÿ«ÿ goooeekÿÿ» nuit et jour. La parade commence en mars, quand la femelle rÿpond aux appels du mâle.



L'athéna est sédentaire dans son habitat, et son territoire est relativement petit. Selon les régions, les couples peuvent se trouver proches les uns des autres et on peut entendre des concerts de cris au crépuscule.

Vol : Elle a un vol très ondulant, avec de rapides battements alternés avec les ailes closes, sur de longues distances. Quand elle poursuit une proie, le vol est plus direct.

Nidification : Le nid de cette chevêche peut être situé sur le sol dans un terrier, ou dans un trou dans un arbre, dans la roche ou dans un immeuble. Le même site est utilisé année après année.

La femelle dépose 3 à 5 oeufs lisses et blancs vers fin avril. L'incubation démarre habituellement avec le premier oeuf pondu, mais parfois, la femelle attend que sa couvée soit complète. L'incubation dure environ 28 à 29 jours, assurée par la femelle qui est nourrie par le mâle. Les poussins sont nidicoles. Ils sont nourris par les deux parents, mais c'est le mâle qui produit la nourriture pendant les deux premières semaines pour la famille entière. Les jeunes quittent le nid au bout de 35 jours, et les parents les nourrissent encore pendant quelques temps. Ils deviennent indépendants au bout de 9 ou 10 semaines.

Régime : Elle se nourrit principalement d'invertébrés et de vers de terre, mais aussi de petits mammifères et d'oiseaux, ainsi que d'amphibiens.

Source : Oiseaux.net