

# Fiche de totem : Paguma



## Floches

Extérieur : Vert

Intérieur : Bordeaux

## Classification

**Sous-Embranchement :** Vertebrata

**Classe :** Mammalia

**Ordre :** Carnivora

**Famille :** Viverridae

## Caractéristiques

**Taille :** De 50 à 76 cm

**Poids :** De 3 à 5 kg

**Longévité :** Environ 20 ans

**Portée :** Entre 1 et 4 petits

**Gestation :**

**Protection :** Inconnu



La pagume (*Paguma larvata*), nommée aussi Civette palmiste à masque ou civette masquée, est un petit carnivore très rare et peu connu de la Chine méridionale et du Sud-Est de l'Asie.

On ne connaît qu'une seule espèce *Paguma larvata*.

On ne sait pratiquement rien sur le mode de vie et les mœurs de cette espèce. Apparentée aux mangoustes et aux genettes, c'est sans doute l'une des espèces les plus mystérieuses et les plus mal connues de la famille des Viverridés. La pagume vit dans les forêts et les maquis buissonnants. Elle porte de curieuses taches blanches sur la tête, ce "masque" lui vaut le nom de pagume larvée ou pagume masquée.

La civette palmiste à masque est un animal omnivore dont le régime alimentaire varié se compose de rats, d'oiseaux, de mollusques, de serpents, de grenouilles, d'insectes et de fruits tels que des figues, des mangues, des bananes et des feuilles. La composition du régime alimentaire varie selon les saisons et les lieux. La civette palmiste à masque est un prédateur nocturne, solitaire et arboricole qui peut, cependant, être actif pendant la journée. Le territoire typique d'un individu est compris entre 1 et 2 km<sup>2</sup>, et une certaine territorialité est apparente. Au cours d'une nuit moyenne, elle est active environ 50 % du temps et peut parcourir jusqu'à 2 km en une seule journée. Lorsqu'il est menacé, l'animal pulvérise une sécrétion de sa glande anale contre le prédateur. Le spray est semblable dans la fonction à celle d'une mouffette, et sa netteté sert à dissuader d'autres prédateurs.

