

Fiche de totem : At lope



Floches

Ext rieur : Jaune

Int rieur : Gris fonc 

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille : Bufonid s

Caract ristiques

Taille : Entre 4 et 5,5 cm

Poids :

Long vit  :

Port e :

Gestation :

Protection : Inconnu



Ces crapauds ont un museau pointu, surmont  d  deux yeux   pupille horizontale et dont l  iris est brun sombre. Leurs tympanes ne sont pas visibles. Ils ont un corps gr le et de longs membres. Leur face dorsale est jaune orang , avec des taches noires. Les doigts de leurs pattes post rieures sont palm s.

Les t tards mesurent moins de 2 cm. Ils ont un corps ovo de. Lors de l closion, les t tards sont blanc translucide et poss dent une grande bouche. Ils deviennent ensuite brun fonc  ou noirs. L  extr mit  de leur queue est arrondie.

On trouve ces crapauds uniquement au Panama, plus pr cis ment dans la Cordill re centrale, en Am rique centrale.

Lors de la saison des pluies, au printemps et en  t , m les et femelles se rassemblent dans les mares nouvellement remplies. Les femelles pondent leurs  ufs en cordon. Ceux-ci  closent rapidement. Les femelles pondent environ 400  ufs. Les t tards se d veloppent tr s rapidement, en une dizaine de jours.

A cause du bruit des ruisseaux que fr quentent les at lopes, ceux-ci pr f rent les gestes avec leurs pattes aux chants. Pour cela, ils se placent en hauteur pour  tre bien vu des femelles et des autres m les qui voudraient prendre son territoire.

Leurs couleurs tr s vives avertissent les pr dateurs de la toxicit  de ces crapauds. Ils sont les plus toxiques des esp ces d telopus.

Ils sont de m urs diurnes et terrestres. Ils se plaisent dans les for ts tropicales humides, en altitude, pr s des ruisseaux

