

# Fiche de totem : Taxidea



## Floches

Extérieur : Orange

Intérieur : Roy

## Classification

**Sous-Embranchement :** Vertebrata

**Classe :** Mammalia

**Ordre :** Carnivora

**Famille :** Mustelidae

## Caractéristiques

**Taille :** Entre 42 et 72 cm de long

**Poids :** 3 à 12 kilos

**Longévité :** 5 à 10 ans

**Portée :** 1 à 5 petits

**Gestation :** 7 mois

**Protection :** Espèce Protégée



Le blaireau d'Amérique (*Taxidea taxus*) est un mammifère appartenant à la famille des Mustelidae. Il est l'unique représentant du genre *Taxidea*. D'apparence similaire au blaireau européen, le blaireau d'Amérique vit, comme son nom l'indique, sur le continent américain.

Sommaire :

Le *Taxidea* est mammifère de taille moyenne mesurant entre 42 et 72 cm de long pour un poids de 3 à 12 kg. La queue mesure entre 10 et 16 cm de long. Le dimorphisme sexuel est présent chez cette espèce, les femelles étant plus petites que les mâles.

Ce mustélide a un corps plat avec des pattes courtes et un visage triangulaire avec un nez long et pointu. Les pieds avant sont plus grands que les pieds arrière et son munis de griffes qu'il utilise pour creuser. Tous les pieds ont 5 orteils de couleur noir ou brun foncé.

La couleur de la fourrure du *Taxidea* peut varier allant du jaune-brun à gris-argent, avec une bande blanche qui s'étend du nez à un point variable sur le cou ou le dos, en fonction de la sous-espèce. Le dessous varie également entre la crème léger et couleur chamois. Il possède également un motif distinctif du visage qui est principalement brun, à l'exception de deux joues qui sont blanches et une tache noire triangulaire à l'avant de chaque oreille. Le cou, le menton et la poitrine sont tous blanchâtres tous. Les dos des petites oreilles arrondies sont noires. Le jeune *Taxidea* est semblable à l'adulte de coloration et les motifs.

Historiquement, le *Taxidea* était également chassé pour sa peau, mais cela ne semble actuellement pas être une menace pour sa survie. Il est très sensible aux parasites tels que les vers plats et les douves, ainsi que des maladies telles que la rage et la tularémie, une maladie infectieuse bactérienne.

## STATUT ET CONSERVATION

2 sous-espèces de blaireau d'Amérique sont considérées comme étant en péril au Canada localement, avec seulement 600 individus de *Taxidea taxus jeffersoni* et 200 de *Taxidea taxus jacksoni*.

