

Fiche de totem : Malécoco



Floches

Extérieur : Blanc

Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu



Cette espèce est endémique du Sulawesi. Il y aurait environ deux à trois mille malécocos vivant actuellement. Toutefois, ceux-ci sont en danger car leurs nids représentent une source de protéines appréciable pour les populations pauvres vivant sur l'île. Autrefois, le nombre d'ufs de malécoco qui pouvait être collecté était fixé par l'autorité, empêchant leur disparition. Certains villages revendiquent un droit coutumier d'accès aux plages de nidification des malécocos, alors que le droit indonésien les protège.

Le malécoco est monogame. Au moment de la ponte, les malécocos creusent un trou, soit dans le terreau de l'île volcanique sur laquelle coulent des ruisseaux d'eau bouillante provenant du sol volcanique, soit sur le sol des plages chauffées par le soleil, afin de trouver un emplacement où la chaleur est suffisante pour permettre le développement et l'éclosion de l'uf pendant les deux à trois mois de son incubation. Cette chaleur empêche également certains prédateurs tels que les varans de s'attaquer aux nids, le sable étant trop chaud pour qu'ils y restent assez longtemps pour déterrer l'uf. Cependant, ceux-ci font l'objet de collecte par les hommes. Les malécocos peuvent enterrer leur uf en quelques heures, mais il est absolument nécessaire qu'ils l'enterrent le jour de sa ponte, sinon celui-ci est perdu. Il y a donc des batailles entre les couples de malécocos au moment où ceux-ci viennent enterrer leur uf. L'oisillon éclos, sort du sable en deux jours et commence à se nourrir lui-même en picorant le sol. Il sait déjà voler, mais peu d'oisillons survivent à leur premiers jours hors du sable.

Caractéristiques :

Diurne, actif, travailleur, soigneux, endurant

