

Fiche de totem : Sylvicapra



Floches

Extérieur : Gris foncé

Intérieur : Orange

Classification

Sous-Embranchement : Vertèbre

Classe : Vertèbre

Ordre : Antilope

Famille : Mammifère

Caractéristiques

Taille : 50 a 60 cm

Poids : 10 a 14 kg

Longévité : 10 ans

Portée : 2

Gestation : 120 jours

Protection : Espèce Protégée



Sylvicapra est un genre monotypique appartenant à la sous-famille des Cephalophinae dans la famille des bovidés. Son unique représentant est le céphalophe de Grimm (*Sylvicapra grimmia*). Le genre *Sylvicapra* fut décrit par William Ogilby, en 1837. La coloration de cette espèce varie considérablement au cours de sa vaste aire de répartition géographique. Il y a 14 sous-espèces décrites, [1] allant de la châtaine dans les régions boisées de l'Angola au gris grisonnant dans les savanes du nord et les nuances brun clair dans les régions arides. Il atteint une taille d'environ 50 cm (20 po) et pèse généralement de 12 à 25 kg (26 à 55 lb); bien que les femelles soient généralement plus grandes et plus lourdes que les mâles. Seul le mâle a des cornes et celles-ci peuvent atteindre 11 cm de long.

La reproduction a lieu toute l'année et la femelle donne naissance à un faon après une période de gestation de 6 à 7,5 mois. Le céphalophe commun a un régime alimentaire large; au-delà de la broutage herbivore des feuilles, des fleurs, des fruits et des tubercules, ils mangent aussi des insectes, des grenouilles, des petits oiseaux et des mammifères, voire des charognes. Tant qu'ils ont de la végétation à manger (à partir de laquelle ils reçoivent de l'eau), ils peuvent rester sans boire pendant de très longues périodes. Pendant la saison des pluies, ils ne boivent souvent pas d'eau, mais obtiennent des fluides à partir des fruits. Ils vont souvent chercher ces fruits sous les arbres dans lesquels les singes se nourrissent. Ils sont actifs jour et nuit, mais deviennent plus nocturnes près des établissements humains.

Les mâles sont des sociétés territoriales et des glandes de frotis sur les rochers et les branches pour marquer leurs territoires; leurs lieux de repos préférés sont généralement sur des terrains élevés, où ils peuvent observer leur territoire. Les femelles, en revanche, préfèrent une couverture plus profonde. Le succès global de cette espèce provient de sa capacité à habiter une grande variété d'habitats, ainsi que de son régime généraliste adaptable. Le céphalophe commun (*Sylvicapra grimmia*), également connu sous le nom de duiker gris ou buisson, est une petite antilope présente en Afrique occidentale, centrale, orientale et australe, essentiellement partout en Afrique au sud du Sahara, à l'exclusion de la corne de l'Afrique et des forêts tropicales du centre et de l'ouest du continent. En général, ils se trouvent dans des habitats avec une couverture végétale suffisante pour leur permettre de se cacher dans les zones de savane et de collines, y compris en bordure des établissements humains.

