

Fiche de totem : Myrmidon



Floches

Extérieur : Gris clair

Intérieur : Rose

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Pilosa

Famille : Myrmécophagidés

Caractéristiques

Taille : 32 à 52cm

Poids :

Longévité :

Portée : 1 petit

Gestation :

Protection : Inconnu



Le Myrmidon (*Cyclopes didactylus*), Fourmilier nain, Petit fourmilier, lèche-main (Guyane) est la plus petite espèce de fourmilier, il mesure entre 32 et 52 cm de long. Il est couvert d'une fourrure brun doré. Ses mâchoires sont incurvées de manière à former un tube court, et il se nourrit de termites et d'autres insectes.

Le museau des myrmidons est conique et très long, tout comme leur langue, qui leur permet de fouiller les habitations de leurs proies. Les myrmidons sécrètent une substance gluante de leurs glandes salivaires qui recouvre leur langue, ce qui leur permet d'attraper les insectes. Leurs oreilles sont petites et rondes, leurs yeux sont petits. Leur queue est longue et souvent préhensile. Leurs mains ont cinq doigts, chacune portant une griffe acérée, la troisième griffe étant la plus développée.

Le fourmilier nain et les tamanduas sont essentiellement nocturnes et marchent sur l'extérieur de leurs pattes antérieures à cause de la longueur de leurs griffes.

Ils se caractérisent par leurs mœurs solitaires et leur taux de reproduction faible. La femelle porte l'unique petit sur son dos pendant sa croissance ; cela peut durer presque un an.