

# Fiche de totem : Marmouset



## Floches

Extérieur : Inconnu

Intérieur : Inconnu

## Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

## Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu



Le marmouset est le deuxième plus petit primate de la planète (après le microcèbe pygmée) ne mesure qu'une douzaine de centimètres. Du fait de sa petite taille, l'ouistiti pygmée a plus de prédateurs potentiels que les autres singes. Les oiseaux de proie présentent une menace constante. Il balaie l'horizon en tournant sa tête sur 180°. Pour éviter de se faire repérer, il arbore une robe cryptique, au-dessus fauve brunâtre mêlé de noir grisâtre. Son mode de déplacement est aussi très spécial : à l'arrêt, il est pratiquement indétectable. Aussi, quand il avance, il le fait parfois avec une très grande lenteur, à la façon d'un paresseux ou d'un caméléon. Ce poids plume peut s'agripper à une tige sans la faire ployer. Mais sa stratégie principale reste celle de la sauterelle : la séquence jaillissement-immobilité. Il peut faire des bonds de 4 m. L'Ouistiti pygmée se déplace en position verticale le long des troncs plus souvent que tout autre singe. Comme l'écureuil, il grimpe en spirale autour des arbres et se cache derrière les troncs, si vite que l'œil humain a du mal à le suivre. Après avoir alterné une série de sprints et de sauts déconcertants, l'ouistiti s'immobilise au sol où sa tenue de camouflage le protège, ou bien se cache derrière une branche.

## Description

La femelle est légèrement plus grande que le mâle. La fourrure est fine, douce et dense. Dessus grisâtre à brun fauve. Dessous orangeâtre, ochracé ou fauve chez l'Ouistiti pygmée du nord, blanchâtre chez l'Ouistiti pygmée du sud. Pieds et mains jaunâtres ou orangeâtres. Queue imperceptiblement annelée de noir. Tête et poitrine couvertes de longues touffes de poils formant une crinière. Face brun sombre éclairée de gris blanchâtre au-dessus de la commissure des lèvres et d'une raie nasale verticale blanchâtre à chamois, marques qui amplifient la perception des expressions faciales et des mouvements de la tête durant la communication visuelle.

L'Ouistiti pygmée diffère physiquement des ouistitis des genres *Callithrix* et *Mico* par une plus petite taille, un pelage agouti strié de bandes, il s'en distingue aussi au niveau des organes génitaux mâles (scrotum sessile et hampe pénienne non épineuse) et de la denture (incisives et prémolaires inférieures). À la différence des autres ouistitis, l'Ouistiti pygmée ne bouge pas la tête de droite à gauche, n'enroule pas sa queue entre ses jambes pendant le repos ou le sommeil, ne fait pas le gros dos pour montrer son hostilité, ne hérisse pas les poils de la couronne lorsqu'il a peur et ne consomme pas de fruits pulpeux. Le juvénile acquiert le coloris facial propre à l'adulte vers l'âge de 5 mois.

## Mensurations

Corps de 12 à 15 cm /Queue de 17 à 23 cm/Poids 120-130 g (de 85 à 160 g)/Cerveau : 4,2 g

## Particularités physiques et comportementales

Le nouveau-né est si minuscule qu'il faut une loupe pour distinguer ses doigts. Un jeune spécimen est encore à peine plus grand qu'un gros criquet, l'un de ses futurs repas...

Chez cette espèce, l'unique femelle adulte du groupe domine tous les autres membres. Il vit le plus souvent en couple monogame. Parfois, il y a plusieurs mâles adultes au sein d'un groupe et, étant donné qu'ils tentent de s'accoupler, on pourrait penser que cette espèce pratique la polyandrie. Néanmoins, un mâle dominant monopolisant l'accès à la seule femelle, le système reproductif demeure fonctionnellement monogamique.

