



Intérieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille : BufonidÃ©s

Caractéristiques

Taille : Entre 4 et 5,5 cm

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu



Ces crapauds ont un museau pointu, surmonté d'yeux à pupille horizontale et dont l'iris est brun sombre. Leurs tympans ne sont pas visibles. Ils ont un corps grêle et de longs membres. Leur face dorsale est jaune orangé, avec des taches noires. Les doigts de leurs pattes postérieures sont palmés.

Les tÃ¢tards mesurent moins de 2 cm. Ils ont un corps ovoÃ¬de. Lors de lâ€™Ã©cllosion, les tÃ¢tards sont blanc translucide et possÃ¨dent une grande bouche. Ils deviennent ensuite brun foncÃ© ou noirs. LÃª™extrÃ©mitÃ© de leur queue est arrondie.

On trouve ces crapauds uniquement au Panama, plus précisément dans la Cordillère centrale, en Amérique centrale.

Lors de la saison des pluies, au printemps et en été, mâles et femelles se rassemblent dans les mares nouvellement remplies. Les femelles pondent leurs œufs en cordon. Ceux-ci se ferment rapidement. Les femelles pondent environ 400 œufs. Les têtards se développent très rapidement, en une dizaine de jours.

A cause du bruit des ruisseaux que frÃ©quentent les atÃ©lopes, ceux-ci prÃ©fÃ©rent les gestes avec leurs pattes aux chants. Pour cela, ils se placent en hauteur pour Ãªtre bien vu des femelles et des autres mÃ©les qui voudrait prendre son territoire.

Leurs couleurs tr ves avertissent les pr dateurs de la toxicit  de ces crapauds. Ils sont les plus toxiques des esp ces d tmelopus.

Ils sont de mÅ“urs diurnes et terrestres. Ils se plaisent dans les forÃ“ats tropicales humides, en altitude, prÃ“s des ruisseaux