

# Fiche de totem : Coereba



## Floches

Extérieur : Jaune

Intérieur : Bleu foncé

### Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

### Caractéristiques

Taille : 10 à 15 cm d'envergure

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu



Coereba ou sucrier. Ce remarquable petit passereau présente un plumage aux couleurs contrastées. Le capuchon, le manteau, le dos et les couvertures alaires sont noirs. Le bord de l'aile porte une barre blanche très évidente. Le croupion jaune éclatant est prolongé par une queue noire. La tête est éclaircie par un épais sourcil blanc très apparent qui commence à la base du bec et se poursuit bien au-delà de l'œil. Le menton et la gorge grise se démarquent très nettement du reste des dessous. La poitrine et le ventre affichent en effet un plumage d'un jaune éclatant. Par ailleurs, le sucrier à ventre jaune est reconnaissable à son bec fin, assez long et nettement recourbé. Les femelles sont assez semblables à leurs partenaires. Ils s'en distinguent toutefois par une calotte légèrement plus sombre, une gorge blanchâtre, et un croupion qui affiche une teinte plus jaune-olive. Certaines sous-espèces possèdent un plumage presque entièrement noir. Chez ce remarquable petit passereau présente un plumage aux couleurs contrastées. Le capuchon, le manteau, le dos et les couvertures alaires sont noirs. Le bord de l'aile porte une barre blanche très évidente au niveau des remiges secondaires. Le croupion jaune éclatant est prolongé par une queue noire. La tête est éclaircie par un épais sourcil blanc très apparent qui commence à la base du bec et se poursuit bien au-delà de l'œil. Le menton et la gorge grise se démarquent très nettement du reste des dessous. La poitrine et le ventre jusqu'aux couvertures sous-caudales affichent en effet un plumage d'un jaune éclatant. Par ailleurs, le sucrier à ventre jaune est reconnaissable à son bec fin, assez long et nettement recourbé. Les femelles sont assez semblables à leurs partenaires. Ils s'en distinguent toutefois par une calotte légèrement plus sombre, une gorge blanchâtre, et un croupion qui affiche une teinte plus jaune-olive. Les juvéniles ont un plumage plus terne que leurs parents et l'ensemble de leur plumage paraît plus jaune-olive. Certaines sous-espèces possèdent un plumage presque entièrement noir. Chez d'autres, certaines couleurs sont absentes ou légèrement différentes.

Son chant est caractérisé par un gazouillement et par un cri aigu ou strident, à la manière d'un insecte.

Essentiellement nectarivore, le sucrier à ventre jaune se nourrit également de fruits comme les bananes mûres, d'araignées et d'insectes tels que les mouches, les coléoptères, les chenilles ou les fourmis qu'il capture sous les feuilles. Le sucrier à ventre jaune apprécie les bains, notamment dans les réserves d'eau.

