Fiche de totem : Tiaris





Floches
Extérieur : Gris foncé

Intérieur : Jaune

Classification

Sous-Embranchement:

Classe: Aves

Ordre: Passiformes
Famille: Thraupidae

Caractéristiques

Taille: Entre 9 et 10 cm

Poids : Longévité :

Portée :

Gestation: De 11 à 13 jours

Protection: Inconnu



Tiaris est un genre de passereaux de la famille des Thraupidae.

Cet oiseau mesure environ 11,5 cm de longueur. Il présente un dimorphisme sexuel : femelle ne présentant pas de coloration noire sur la face et plus terne que le mâle.

Le plumage est vert olive avec des traces jaunes sur les ailes et la queue. Deux longs sourcils jaunes partent du bec vers les zones auriculaires. La gorge est jaune orangé et la poitrine noire (tout comme le front chez le mâle). Les flancs sont gris. Les yeux sont marron, le bec noir et les pattes gris sombre.

Le tiaris est un genre de passereaux de la famille (des Thraupidae), contenant l'essentiel des pinsons. Cet oiseau est originaire de Cuba, des Caraïbes, d'Amérique du nord et des Antilles, il aime vivre dans les maquis broussailleux, prairies ou en lisière de forêt.

Description:

Le visage noir de jais et la gorge du mâle, bordé de jaune vif, est frappante. Le reste du plumage est vert olive. Les femelles ont un plumage brun au lieu de noir

Des couleurs brillantes, une attitude fière et une activité constante font que le tiaris apparait plus grand que ses 9 ou 10 centimètres.

Le couple forme un duo très fort et attaquera souvent les autres espèces non apparentées.

Les mâles célibataires peuvent être agressifs, ou plus encore, lorsqu'ils sont en couple...

Certains tiaris peuvent, sans raison apparente, détruire le nid ou jeter les oisillons.

L'incubation, qui dure 11 à 13 jours, est assurée par la femelle seule, mais les deux parents nourrissent les nouveau-nés. Les oisillons prennent leur envol dans les 12 à 17 jours, date à laquelle la femelle souvent reniche tandis que le mâle continue à nourrir les jeunes à l'envol pour jusqu'à un mois de plus.

Le plumage jaune sur la face commence à apparaître à l'âge 3 mois ou plus.

