

Fiche de totem : Brochet



Floches

Extérieur : Orange

Intérieur : Brun clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Actinopterygii

Ordre : Esociformes

Famille : Esocidae

Caractéristiques

Taille : 30 à 110 cm

Poids : 2 à 10 kg

Longévité : 20 ans

Portée : Jusqu'à 600.000 oeufs

Gestation :

Protection : Espèce Protégée



Le brochet ou grand brochet (*Esox lucius*) est une espèce de poissons qui habite les fleuves et rivières, les lacs et les étangs d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie et du Maroc.

Le brochet est fusiforme et couvert de fines écailles, avec des différences selon son milieu de vie. Les flancs et le dos sont généralement verdâtres ou jaunâtres. Sa taille varie de 30 à 110 cm et son poids entre 2 et 10 kg.

C'est un chasseur sédentaire et solitaire. Dans les grands lacs, on le trouve aussi en bancs, surtout quand il s'agit de jeunes sujets. Le brochet peut vivre plus de 20 ans.

Le brochet aime la lumière et s'aventure souvent en bordure. Il patrouille régulièrement sur son territoire qu'il défend contre toute intrusion, et il vit parfois temporairement en groupe de 2 ou 3 individus.

Il se nourrit de poissons vivants, malades ou morts, mais ne dédaigne pas quelques extras (écrevisse, grenouille, caneton, poule d'eau, rongeur...). C'est un poisson qui chasse en embuscade : il se camoufle dans les herbes aquatiques ou se confond avec des branchages immergés, et attend qu'une proie passe à sa portée. Son corps élancé n'est pas adapté à de longues poursuites mais bien aux accélérations brusques et en ligne droite. Il n'est pas rare qu'il s'attaque à un poisson pris à la ligne d'un pêcheur.

Le grand brochet est un carnivore opportuniste qui se nourrit de tout ce qui est le plus facile à capturer. La taille de ses proies peut être aussi grande que le tiers ou la moitié de sa propre taille.

La période de frai se produit de février à avril (eau entre 5 et 12 °C). La femelle pond entre 15 000 et 20 000 œufs par kilogramme de son poids (entre 3 000 et 600 000 œufs). Les œufs sont déposés dans les herbiers situés près des berges.

