

Fiche de totem : OnorÃ©



Floches

Extérieur : Inconnu

Intérieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Oiseaux

Ordre : Psittaciformes

Famille : Ardeidés

Caractéristiques

Taille : 81 cm

Poids : 1046 à 1274 g

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu



Comme leur nom le suggère, les onorÃ©s du Mexique sont originaires d'Amérique Centrale, mais on les trouve également en Colombie, dans l'extrême nord-ouest du continent sud-américain. La limite nord de son aire de distribution se situe au niveau du sud du Mexique, dans les États du Tamaulipas et du Yucatan, tandis que la limite sud est marquée par le cours de la rivière Atrato au nord de la Colombie. Les populations vivant dans les zones montagneuses à la limite du Sinoloa et de Sonora étaient autrefois considérées comme une sous-espèce sous le nom de *Tigrisoma fremitus*. En dépit de leur rayures plus abondantes, elles ont été réintégrées dans la race nominale *mexicanum* et l'espèce est désormais considérée comme monotypique.

Les onorÃ©s du Mexique sont des chasseurs ou des pêcheurs solitaires, mais on peut parfois les apercevoir en groupes dispersés d'une douzaine d'individus au Honduras et au Panama. De fréquents croassements émis au crépuscule ou à la nuit tombée laissent suggérer que cette espèce est sans doute un prédateur nocturne. Les onorÃ©s du Mexique pêchent en se tenant immobiles à l'intérieur des cours d'eau peu profonds. Ils se tiennent à l'affût, à moitié cachés par le feuillage et prêts à harponner d'un coup de bec rapide une proie qui passe à leur portée. Quand ils poursuivent une victime, ils marchent également doucement et prudemment à une certaine distance du couvert car ce ne sont pas des oiseaux craintifs.

Quand ils paradent, les membres du couple se tiennent généralement face à face, le corps tendu et les plumes du cou hérissées. L'un des deux avance de quelques pas rapides. En même temps, il dresse le cou et le bec verticalement, baisse le cou et les plumes du corps, émet 2 ou 3 rugissements avant de reculer jusqu'à sa position initiale. Pendant cela, le second reste sur place mais imite les mouvements et les cris du premier. La totalité des rituels dure quelques secondes et est répétée à 4 ou 5 reprises. Dans certains cas, de pareilles performances sont accompagnées de balancements rythmés du cou et de croassements qui alternent avec des périodes de silence au cours desquelles les individus sont tapis. Les onorÃ©s du Mexique ne sont pas vocaux que pendant les parades. Pendant toute l'année, surtout en soirée ou pendant la nuit, ils produisent toutes sortes de cris rauques comme des ronflements répétitifs, des aboiements et des beuglements rugueux.

La saison de nidification est variable selon les régions. Au Costa Rica, la reproduction peut se dérouler pendant presque tous les mois de l'année mais le paroxysme dans l'activité est atteint au début de la saison des pluies. Dans la majeure partie de l'aire de distribution, le début des œufs a lieu entre le mois de mai et le mois d'août, excepté au Panama où il intervient entre février et avril. Dans le Yucatan qui constitue le cœur de leur territoire, les mâles sont en état de se reproduire dès le mois de février.

Les nids sont de grande taille. Ce sont des structures relativement fragiles construites avec des morceaux de bois et placées sur une branche au dessus du courant ou d'une eau dormante à une hauteur comprise entre 6 et 15 mètres. Dans l'archipel de las Perlas, dans le golfe de Panama, les nids sont situés sur des branches basses à environ 4 mètres au-dessus du sol dans une région de falaises calcaires.

Les œufs ont la plupart du temps une couleur blanc uni avec une légère nuance verdâtre, bien que certains spécimens du Panama aient été décrits comme partiellement recouverts de taches rose chamois. Ils ont une dimension de 57 mm sur 44. Les pontes complètes comprennent entre 1 et 3 œufs dont la durée d'incubation est inconnue.



Les oisillons ont un duvet gris-blanc. Leur capuchon est recouvert de plumes filamenteuses et Ã©rectiles d'un blanc pur. On ne possÃ©de pratiquement aucun renseignement sur la pÃ©riode de sÃ©jour au nid et sur le soin parental. Les juvÃ©niles risquent l'attaque des prÃ©dateurs du genre Buteogallus.

Dans certaines rÃ©gions, la pÃ©riode de reproduction est longue et il peut parfois y avoir des couvÃ©es de remplacement et des secondes nichÃ©es en cas de conditions favorables.

Les onorÃ©s du Mexique recherchent leur nourriture au crÃ©puscule mais aussi partiellement la nuit. Leur menu est exclusivement carnivore : ils consomment des poissons, des grenouilles et des amphibiens, des crabes ainsi que des mouches. Pour leurs techniques de chasse ou de pÃ©che, se reporter Ã la rubrique "comportements".

