

Fiche de totem : Kehibella



Floches

Extérieur : Jaune

Intérieur : Mauve clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Aves

Ordre : Passériformes

Famille : Artamidés

Caractéristiques

Taille : 47 cm

Poids : 196 g

Longévité :

Portée : 3 à 5 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu



Au Sri Lanka, la pirolle est connue sous le nom de « Kehibella » en langue cinghalaise.

Les pirolles de Ceylan possèdent un riche vocabulaire qui comprend aussi des imitations. Les groupes qui se nourrissent ont une conversation plutôt calme formée de piépiements et de couinements. Pirolle de Ceylan discrets auxquels viennent se mêler parfois quelques notes rauques et grinçantes. L'un des cris les plus caractéristiques consiste en un tintement puissant, portant loin et émis avec le bec grand ouvert : 'chink-chink' ou 'cheek-cheek' répétés avec quelques variantes. On peut parfois aussi entendre un 'crakrakrakrak' répétés, un puissant 'whee-whee' ou 'tweewi-kra'. Un chant triste composé de couinements, de bavardages, de bruits de succion mêlés avec des imitations d'autres espèces d'oiseaux est souvent rapporté. Les pirolles de Ceylan ont la réputation de chanter surtout en période de temps humide.

Cet oiseau fréquente les forêts denses et humides de feuillus, y compris les lisières des plantations de thé. Il vit à la fois dans les zones humides de plaine et dans les collines, entre 150 et 2100 mètres d'altitude.

Endémique du Sri Lanka, il est confiné dans la partie sud-ouest de l'île (principalement provinces d'Uva et Central).

Ces oiseaux agiles errent dans les forêts humides de colline en petites bandes pouvant compter jusqu'à sept membres. Il leur arrive aussi parfois de se déplacer seul ou en couple. Les groupes semblent rechercher leur nourriture sur d'assez vastes territoires. Ce sont surtout des oiseaux du sommet des arbres, ce qui ne les empêche pas de prospecter dans les buissons bas et même de descendre au niveau du sol. Ils inspectent bruyamment le feuillage, sautillant de branches en branches, fouillant dans les grappes de feuilles, sous les morceaux d'écorce décollés, se penchant parfois tête en l'air à la manière des moustiques, et s'agrippant malgré leur masse importante à la bordure des larges feuilles. Les pirolles de Ceylan préfèrent voler sur une courte distance d'un arbre à l'autre. Lorsqu'elles quittent un perchoir, elles ont tendance à se laisser tomber jusqu'à quelques centimètres du sol, puis elles remontent majestueusement jusqu'au prochain perchoir.

C'est probablement un nicheur solitaire. Son nid rappelle celui d'un corbeau, mais il est de taille inférieure. C'est une construction de branches dont la coupe intérieure est garnie de fines radicelles et de lichens qui ont l'apparence de fines barbillons. Il est placé dans le feuillage de grands arbres ou sur les branches extérieures de certains arbustes, à une hauteur qui varie de 5 à 13 mètres au-dessus du sol. La ponte comprend trois à cinq oeufs, plus généralement trois. Ils sont de couleur blanchâtre avec de nombreuses mouchetures et taches brun-terre. La saison de nidification se déroule de la mi-janvier jusqu'à la fin mars.

Son régime comprend un grand nombre d'invertébrés vivant dans les arbres tels que les criquets, les chenilles, les coléoptères. Celui-ci comprend aussi des grenouilles arboricoles et des petits lézards. La pirolle de Ceylan consomme également des fruits mais c'est surtout une carnivore. Les chenilles velues sont précautionneusement mais vigoureusement frottées contre les branches pour leur ôter leurs poils urticants.