

# Fiche de totem : OnorÃ©



## Floches

**ExtÃ©rieur :** Gris clair

**IntÃ©rieur :** Brun clair

## Classification

**Sous-Embranchement :** VertÃ©brÃ©s

**Classe :** Oiseaux

**Ordre :** PÃ©lÃ©caniformes

**Famille :** ArdÃ©idÃ©s

## CaractÃ©ristiques

**Taille :** 81 cm

**Poids :** 1046 Ã 1274 g

**LongÃ©vitÃ© :**

**PortÃ©e :**

**Gestation :**

**Protection :** Inconnu



Comme leur nom le suggÃ¨re, les onorÃ©s du Mexique sont originaires d'AmÃ©rique Centrale, mais on les trouve Ã©galement en Colombie, dans l'extrÃªme nord-ouest du continent sud-amÃ©ricain. La limite nord de son aire de distribution se situe au niveau du sud du Mexique, dans les Ã©tats du Tamaulipas et du Yucatan, tandis que la limite sud est marquÃ©e par le cours de la riviÃ¨re Atrato au nord de la Colombie. Les populations vivant dans les zones montagneuses Ã la limite du Sinoloa et de Sonotra Ã©taient autrefois considÃ©rÃ©es comme une sous-espÃ¨ce sous le nom de *Tigrisoma fremitus*. En dÃ©pit de leur rayures plus abondantes, elles ont Ã©tÃ© rÃ©intÃ©grÃ©es dans la race nominale *mexicanum* et l'espÃ¨ce est dÃ©sormais considÃ©rÃ©e comme monotypique.

Les onorÃ©s du Mexique sont des chasseurs ou des pÃ©cheurs solitaires, mais on peut parfois les apercevoir en groupes dispersÃ©s d'une douzaine d'individus au Honduras et au Panama. De frÃ©quents croisements Ã©mis au crÃ©puscule ou Ã la nuit tombÃ©e laissent suggÃ©rer que cette espÃ¨ce est sans doute un prÃ©dateur nocturne. Les onorÃ©s du MÃ©xique pÃ©chent en se tenant immobiles Ã l'intÃ©rieur des cours d'eau peu profonds. Ils se tiennent Ã l'affÃ»t, Ã moitiÃ© cachÃ©s par le feuillage et prÃ©ts Ã harponner d'un coup de bec rapide une proie qui passe Ã leur portÃ©e. Quand ils poursuivent une victime, ils marchent Ã©galement doucement et prudemment Ã une certaine distance du couvert car ce ne sont pas des oiseaux craintifs.

Quand ils paradent, les membres du couple se tiennent gÃ©nÃ©ralement face Ã face, le corps tendu et les plumes du cou hÃ©rissÃ©es. L'un des deux avance de quelques pas rapides. En mÃªme temps, il dresse le cou et le bec verticalement, baisse le cou et les plumes du corps, Ã©met 2 ou 3 rugissements rauques avant de reculer jusqu'Ã sa position initiale. Pendant cela, le second reste sur place mais imite les mouvements et les cris du premier. La totalitÃ© des rituels dure quelques secondes et est rÃ©pÃ©tÃ©e Ã 4 ou 5 reprises. Dans certains cas, de pareilles performances sont accompagnÃ©es de balancements rythmÃ©s du cou et de croisements qui alternent avec des pÃ©riodes de silence au cours desquelles les individus sont tapis. Les onorÃ©s du Mexique ne sont pas vocaux que pendant les parades. Pendant toute l'annÃ©e, surtout en soirÃ©e ou pendant la nuit, ils produisent toutes sortes de cris rauques comme des ronflements rÃ©pÃ©titifs, des aboiements et des beuglements rugueux.

La saison de nidification est variable selon les rÃ©gions. Au Costa Rica, la reproduction peut se dÃ©rouler pendant presque tous les mois de l'annÃ©e mais le paroxysme dans l'activitÃ© est atteint au dÃ©but de la saison des pluies. Dans la majeure partie de l'aire de distribution, le dÃ©pÃ´t des Ã©ufs a lieu entre le mois de mai et le mois d'aoÃ»t, exceptÃ© au Panama oÃ¹ il intervient entre fÃ©vrier et avril. Dans le Yucatan qui constitue le cÅ«ur de leur territoire, les mÃªles sont en Ã©tat de se reproduire dÃ©s le mois de fÃ©vrier.

Les nids sont de grande taille. Ce sont des structures relativement fragiles construites avec des morceaux de bois et placÃ©es sur une branche au dessus du courant ou d'une eau dormante Ã une hauteur comprise entre 6 et 15 mÃªtres. Dans l'archipel de las Perlas, dans le golfe de Panama, les nids sont situÃ©s sur des branches basses Ã environ 4 mÃªtres au-dessus du sol dans une rÃ©gion de falaises cÃ©lÃ©stres.

Les Ã©ufs ont la plupart du temps une couleur blanc uni avec une lÃ©gÃ¨re nuance verdÃ¢tre, bien que certains spÃ©cimens du Panama aient Ã©tÃ© dÃ©crits comme partiellement recouverts de taches rose chamoisÃ©. Ils ont une dimension de 57 mm sur 44. Les pontes complÃ©tes comprennent entre 1 et 3 Ã©ufs dont la durÃ©e d'incubation est inconnue.



Les oisillons ont un duvet gris-blanc. Leur capuchon est recouvert de plumes filamenteuses et rectilignes d'un blanc pur. On ne possède pratiquement aucun renseignement sur la période de séjour au nid et sur le soin parental. Les juvéniles risquent l'attaque des prédateurs du genre *Buteogallus*.

Dans certaines régions, la période de reproduction est longue et il peut parfois y avoir des couvées de remplacement et des secondes nichées en cas de conditions favorables.

Les onorcas du Mexique recherchent leur nourriture au crépuscule mais aussi partiellement la nuit. Leur menu est exclusivement carnivore : ils consomment des poissons, des grenouilles et des amphibiens, des crabes ainsi que des mouches. Pour leurs techniques de chasse ou de pêche, se reporter à la rubrique "comportements".