

Fiche de totem : Murucutu



Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : Beige

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Aves

Ordre : Strigiformes

Famille : Strigidés

Caractéristiques

Taille : 52 cm

Poids : 591 à 982 g

Longévité :

Portée : 2 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu



La Clouette à lunettes est appelée Murucutu au Brésil.

Habitat : Les chouettes à lunettes fréquentent les forêts tropicales et subtropicales plutôt denses pourvu qu'elles aient des arbres de grande taille. On les trouve également à l'intérieur des forêts pluviales denses ainsi qu'à proximité des clairières et des lisières des zones boisées. Elles ne dédaignent pas les plantations et les futaies. On peut aussi les observer à de plus hautes altitudes, c'est à dire jusqu'à 1 500 mètres au Costa Rica.

Comportements : Les chouettes à lunettes sont sociales. Elles ne sont pas strictement nocturnes, leur activité commençant juste avant le crépuscule et se poursuivant un peu après l'aube. Dans la journée, elles se reposent en solitaire dans les arbres qui ont un épais feuillage. Après la tombée de la nuit, elles partent de leur perchoir et elles volent avec des battements de faible amplitude en surveillant le sol. Leurs vocalises sont plus fréquentes par les calmes nuits de pleine lune. Les chouettes à lunettes sont réputées sédentaires.

La Chouette à lunettes se perche souvent le long des cours d'eau dans les galeries forestières. Elle est seule ou en couple.

Elle chasse la nuit depuis un perchoir sur une branche exposée. Elle descend rapidement et capture la proie sur le sol ou sur la végétation, et retourne ensuite sur son perchoir.

Elle se nourrit surtout de petits mammifères tels que les opossums, lapins et rongeurs. Il lui arrive de capturer des chauves-souris, des grenouilles et des lézards. Les oiseaux comme les tourterelles, les geais et les cassiques font aussi partie de son alimentation, tout comme les grands insectes et chenilles et quelques petits crustacés.

Elle peut occasionnellement chasser pendant la journée. Elle chasse en général le long des lisières des forêts ou dans les savanes semi-découvertes avec de grands arbres.

Sinon, pendant la journée, elle se repose sur une branche dans la forêt. Comme d'autres espèces d'oiseaux, elle rejette des pelotes qui contiennent les parties indigestes de ses proies, os, poils et plumes.

Les parades des chouettes sont peu connues à cause de leur discrétion et de leurs habitudes nocturnes, mais habituellement, le mâle devient plus bruyant quelques semaines avant la reproduction. Des offrandes de nourriture à la femelle sont communes, accompagnées de mouvements du corps et des ailes par le mâle. Le lissage mutuel des plumes est destiné à renforcer les liens du couple.

La Chouette à lunettes est monogame et nidifie dans des cavités.

Vol : La Chouette à lunettes, comme les autres Strigidés nocturnes, a un vol silencieux quand elle chasse pendant la nuit, grâce aux plumes douces de ses ailes.



Nidification : Dans le milieu naturel, le comportement nuptial est peu connu. Le mâle revendique son territoire en chantant à partir d'un perchoir élevé, souvent dans le tiers supérieur d'un grand arbre. La femelle répond à son partenaire en chantant et les duos peuvent être alors entendus lors des nuits qui sont bien éclairées par la lune. Une grande cavité naturelle trouvée dans une branche ou éventuellement dans un tronc sert généralement comme site de nidification. La femelle pond habituellement 2 œufs blancs dont les dimensions sont environ de 45 millimètres sur 38. Ils sont déposés directement sur le fond du trou et couvés par la femelle seule pendant approximativement 5 semaines. Les poussins sont nourris principalement par la femelle et ils quittent le nid au bout de 5 à 6 semaines, bien qu'ils ne soient pas encore très performants en vol. Les juvéniles restent dépendants de leurs parents pendant encore de nombreux mois. Ils atteignent la maturité sexuelle alors qu'ils n'ont pas encore atteint leur plumage définitif (voir caractères distinctifs).

Régime : Les chouettes à lunettes mangent généralement de petits mammifères allant jusqu'à la taille d'un opossum. Elles attrapent également de petits oiseaux pouvant atteindre la taille d'un pigeon. Elles attaquent aussi des petits-ducs du genre Megascops. Leur menu est complété par des insectes et des chenilles qu'elles arrachent sur le sol ou dans les feuillages. Dans certaines régions, elles peuvent capturer des crabes et des grandes araignées.

Source : Oiseaux.net