

Fiche de totem : MalÃ©o



Floches

ExtÃ©rieur : Blanc

IntÃ©rieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

CaractÃ©ristiques

Taille :

Poids :

LongÃ©vitÃ© :

PortÃ©e :

Gestation :

Protection : Inconnu

Cette espÃ©ce est endÃ©mique du Sulawesi. Il y aurait environ deux Ã trois mille malÃ©os vivant actuellement. Toutefois, ceux-ci sont en danger car leurs Ã©ufs reprÃ©sentent une source de protÃ©ines apprÃ©ciable pour les populations pauvres vivant sur l'Ã¢le. Autrefois, le nombre d'Ã©ufs de malÃ©o qui pouvait Ãªtre collectÃ© Ã©tait fixÃ© par l'autoritÃ©, empÃªchant leur disparition. Certains villages revendiquent un droit coutumier d'accÃ©s aux plages de nidification des malÃ©os, alors que le droit indonÃ©sien les protÃ©ge.

Le malÃ©o est monogame. Au moment de la ponte, les malÃ©os creusent un trou, soit dans le terreau de l'Ã¢le volcanique sur laquelle coulent des ruisseaux d'eau bouillante provenant du sol volcanique, soit sur le sol des plages chauffÃ©es par le soleil, afin de trouver un emplacement oÃ¹ la chaleur est suffisante pour permettre le dÃ©veloppement et l'Ã©closion de l'Ã©uf pendant les deux Ã trois mois de son incubation. Cette chaleur empÃªche Ã©galement certains prÃ©dateurs tels que les varans de s'attaquer aux Ã©ufs, le sable Ã©tant trop chaud pour qu'ils y restent assez longtemps pour dÃ©terrer l'Ã©uf. Cependant, ceux-ci font l'objet de collecte par les hommes. Les malÃ©os peuvent enterrer leur Ã©uf en quelques heures, mais il est absolument nÃ©cessaire qu'ils l'enterrent le jour de sa ponte, sinon celui-ci est perdu. Il y a donc des batailles entre les couples de malÃ©os au moment oÃ¹ ceux-ci viennent enterrer leur Ã©uf. L'oisillon Ã©clop, sort du sable en deux jours et commence Ã se nourrir lui-mÃªme en picorant le sol. Il sait dÃ©jÃ voler, mais peu d'oisillons survivent Ã leur premiers jours hors du sable.

CaractÃ©ristiques :

Diurne, actif, travailleur, soigneux, endurant

