

Fiche de totem : Astrild



Floches

Extérieur : Beige

Intérieur : Rouge

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre : Passériformes

Famille : Estrildidés

Caractéristiques

Taille : 13 cm

Poids : 6 à 11 g

Longévité : 8 ans

Portée : 4 à 7 oeufs

Gestation : 11 à 13 jours

Protection : Espèce non-protégée



L'astrild est un petit passereau.

C'est un oiseau grégaire et monogame. Les déplacements se font en groupes plus ou moins lâches mais bruyants et les individus se retrouvent pour la nuit en dortoirs. Très nombreux dans les cultures, ils ont un impact destructeur dans les régions où ils ont été introduits. Paradoxalement, cet impact est moindre dans leurs régions d'origines. Pourtant, il est probable qu'ils aient un rôle important dans la dispersion des graines. Enfin, ils ne semblent pas avoir d'impact sur les oiseaux granivores indigènes puisqu'ils se nourrissent plus de graminées introduites. Ils se nourrissent en début de matinée et en fin d'après-midi. Ils se cramponnent aux tiges avec leurs longues griffes et picorent la tête des fleurs. Ils vont également chercher les graines au sol. Essentiellement granivores, les points d'eau sont donc très importants pour eux. Les groupes d'oiseaux se mêlangent aussi au milieu des troupeaux de ruminants où ils peuvent être des milliers. Très sociable, l'astrild ondulé utilise le chant et le langage corporel pour communiquer avec ses congénères.

L'astrild ondulé est indigène de nombreuses régions d'Afrique Subsaharienne où il existe 17 sous-espèces. En Afrique Australe, il est absent des régions désertiques ou des forêts denses. À l'ouest, il existe une population très localisée en Sierra Leone, au Liberia et en Côte d'Ivoire. L'espèce a été introduite sur le bassin méditerranéen, devenue présente au Portugal elle se répand à travers l'Espagne. Il y a des petites populations sur Madère et Grande Canarie. Récemment, il a été vu sur Tenerife et les Açores. Il est présent en Océanie, à Maurice, à La Réunion, sur Rodrigues, aux Seychelles et sur l'île Amsterdam. Dans le Pacifique, on le trouve en Nouvelle-Calédonie, sur l'île Fatoua (une île du Vanuatu), à Tahiti et sur les îles hawaïennes. En Amérique, il est à Trinité, dans plusieurs régions du Brésil et quelques individus sont sur les Bermudes. Sa capacité à trouver de nouvelles sources de nourritures et son succès de reproduction lui ont permis de coloniser facilement toutes ces nouvelles zones.

L'espèce sur la photo est l'astrild ondulé.

