

Fiche de totem : Blatte



Floches

Extérieur : Bordeaux

Intérieur : Gris foncé

Classification

Sous-Embranchement : Hexapoda

Classe : Insecta

Ordre : Blattodea

Famille : Blattidea

Caractéristiques

Taille : 1 cm - 9 cm

Poids :

Longévité : 10 mois - 12 mois

Portée : 10 - 40

Gestation : 2 mois - 3 mois

Protection : Inconnu



Les blattes et les termites appartiennent à l'ordre des blattoptères (Blattodea). La classification de ces groupes est encore sujette à différentes hypothèses. L'une d'entre elles voudrait qu'ils soient inclus avec les mantes dans l'ordre des Dictyoptera. D'autres voudraient les séparer complètement, les blattes faisant partie de l'ordre des Blattodea et les termites de l'ordre des Isoptera. Cependant, les dernières recherches sur la génétique de ces groupes suggèrent qu'ils ont évolué d'un ancêtre commun et qu'ils sont ainsi fortement liés.

La blatte est aussi appelée cafard ou cancrelat en Europe, coquerelle au Canada et ravet aux Antilles. Ces insectes sont considérés comme « nuisibles » à cause des maux de certaines de leurs espèces. Au total, moins de 1 % des espèces connues de blattes interagissent avec l'être humain et peuvent être réellement considérées comme des indésirables. Près de 25 à 30 espèces peuvent être problématiques et de ce nombre, la moitié cause des problèmes occasionnels.

Les espèces dites « nuisibles » sont synanthropes et on les retrouve principalement dans les cuisines, où elles se nourrissent des déchets des humains.

Les quelque 4 600 espèces[1] réparties à travers le monde varient en forme, en couleur et en taille. Leur apparition sur Terre date de près de 355 millions d'années.

Source [https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cancrelat_\(homonymie\)](https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cancrelat_(homonymie))

