

Fiche de totem : Iduna



Floches

Extérieur : Jaune

Intérieur : Bleu clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Acrocephalidae

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée : 3 à 4 oeufs

Gestation : /

Protection : Inconnu

L'Hypolaïs bottée (Iduna caligata) est une espèce de petits oiseaux de la famille des Acrocephalidae.

L'Hypolaïs d'émarré (Iduna caligata) est un Hypolaïs du Vieux Monde dans le groupe des Hypolaïs d'arbres. Il était autrefois considéré comme conspécifique avec l'Hypolaïs de Sykes, mais les deux sont maintenant généralement tous deux accordés le statut d'espèce. L'hypolaïs bottée elle-même se reproduit du centre de la Russie à l'ouest de la Chine, et migre vers l'hiver dans le sous-continent indien aussi loin au sud que le Sri Lanka. L'hypolaïs botté a élargi son aire de reproduction vers l'ouest et au nord que la Finlande. C'est un petit oiseau passin, trouvé dans le pays ouvert avec des buissons et d'autres hautes végétations. 3-4 œufs sont pondus dans un nid dans un buisson ou une végétation. Comme la plupart des hypolaïs, ils sont insectivores.

Ce sont de petites hypolaïs, surtout par rapport à d'autres dans leur genre. Ils sont brun pâle (couleur très faible) ci-dessus et blanchâtre ci-dessous avec des flancs buff. Les plumes de la queue extérieure ont des bords pâles. Ils ont un supercilium pâle court, et le projet de loi est fort et pointu. Sykes est plus grand et plus gris que bottée, et ressemble le plus à une hypolaïs olivace orientale.

Keyserling et Blasius n'ont donné aucune explication du nom de genre Iduna. Le caligata spécifique est latin pour "booted" de caliga, "boot".

