

Fiche de totem : Takahā



Floches

Extérieur : Inconnu

Intérieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Aves

Ordre : Gruiformes

Famille : Rallidae

Caractéristiques

Taille : 30 Å 50cm

Poids : 3kg

Longévit  :

Port e :

Gestation :

Protection : Esp ce Prot g e



Le Takah  est une esp ce d'oiseaux end mique de l' le du Sud de la Nouvelle-Z lande. Cet oiseau a d'abord  t  nomm  Notornis. Cette esp ce a longtemps  t  regroup e avec celle de l' le du Nord, qui elle est  teinte, Porphyrio mantelli, sous le nom de tal ve takah? ou takah?.

Avant une exp dition men e par Geoffrey Orbell en 1948, le takah? du Sud  tait consid r  comme une esp ce  teinte par la communaut  scientifique internationale. La d couverte de sp cimens dans le Fiordland, une zone difficile d'acc s au Sud-Ouest de la Nouvelle-Z lande, a engendr  la cr ation d'un parc naturel de 500 km² sur le lieu de la d couverte.

En 1981, la population  tait de 120 individus. En 2006, elle  tait de 3132 et en 2019 de 4183.

Traits de personnalit  : Timide, r serv , bon buveur, gai, autonome, rieur, fraternel, vit avec ces semblables.