


Fiche de totem : Pumilio L



Floches

Extérieur : Mauve clair

Intérieur : Violet

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Rongeurs

Famille : Sciuridé

Caractéristiques

Taille : 13cm

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu



Myosciurus pumilio est une espèce de rongeurs de la famille des Sciuridae. Elle est l'unique espèce du genre *Myosciurus*.

L'écureuil pygmée africain vit au Cameroun, au Congo- Brazzaville, en Guinée équatoriale et au Gabon. Son habitat naturel sont les forêts humides subtropicales ou tropicales. Elle est menacée par la destruction de son habitat. Sa taille mesure environ 13 cm

Le terme écureuil est un nom vernaculaire ambigu qui désigne en français de

nombreuses espèces de rongeurs grimpeurs de taille moyenne, parfois même « volants ». Leur queue, plus ou moins touffue selon les espèces, forme un panache ou un plumeau caractéristique. Ils appartiennent presque tous à la famille des Sciuridés, qui comprend aussi les chiens de prairies et les marmottes, mais quelques écureuils volants font partie de la famille

des Anomaluridés.

La queue en panache de l'écureuil et son acharnement à faire des provisions pour l'hiver ont contribué à sa popularité et en ont fait un animal emblématique souvent présent dans la symbolique et la culture.

Les caractéristiques générales des écureuils sont

celles des rongeurs de la famille des Sciuridés, ou

des Anomaluridés pour certains écureuils volants, avec

des nuances pour chaque espèce. 56 % sont

arboricoles, 12,5 % sont terrestres et 31,5 % volantes.

Ils ne sont absents que d'îles et de certains archipels,

de l'Australie, de l'Antarctique et de la pointe sud de

l'Amérique, ainsi que d'une zone concernant l'Est de

l'Afrique du Nord et une partie du

Moyen-Orient.

Leur régime alimentaire varie selon l'habitat et la

saison : cônes de résineux et fruits à coque (glands,

noisettes) qui constituent leur principale source

alimentaire, bourgeons, fleurs et fruits d'une grande

variété. À la fin de l'été, ils peuvent amasser des fruits

dans des caches et contribuer à la dissémination des

graines lorsqu'ils ne récupèrent pas ces ressources alimentaires. Le pillage de leurs greniers

par des compétiteurs est fréquent, ce qui explique la stratégie de tromperie adoptée par

certaines espèces qui conçoivent des caches vides au sein de sites potentiels pour

décourager les voleurs.



Les écureuils vont généralement avoir une à deux portées dans l'année. Le nombre de petits

issus de ces portées dépendra de l'espèce. Bien que les petits voient le jour sans fourrure,

aveugles et sans dents, ils grandissent vite pour arriver à l'aspect que nous connaissons.

