# Fiche de totem : XÃ©narthres

**Floches**
**Extérieur :** Brun foncÃ©
**Intérieur :** Gris clair

## Classification

**Sous-Embranchement :** Vertebrata
**Classe :** Mammalia
**Ordre :**
**Famille :**

## Caractéristiques

**Taille :**
**Poids :**
**Longévité :**
**Portée :**
**Gestation :**
**Protection :** Inconnu

Le super-ordre des xÃ©narthres (Xenarthra) est un groupe de mammifÃ¨res placentaires (infra-classe des euthÃ©riens), prÃ©sents de nos jours uniquement en AmÃ©rique. Les origines de l'ordre remontent au dÃ©but du Tertiaire (il y a environ 60 millions d'annÃ©es, peu aprÃ¨s le MÃ©sozoÃ¯que) sur le continent sud-amÃ©ricain. La prÃ©sence de ces animaux en AmÃ©rique du Nord est expliquÃ©e par le grand Ã©change inter-amÃ©ricain.

Il comprend les fourmiliers, les paresseux, et les tatous. Au XIXe siÃ¨cle, ces familles formaient avec les pangolins et l'oryctÃ©rope l'ordre des Ã©dentÃ©s (qui n'ont pas de dents, car les membres de cet ordre ne possÃ©daient ni incisive ni molaire, ou n'avaient que des molaires trÃ¨s peu dÃ©veloppÃ©es)1. On s'aperÃ§ut par la suite que l'ordre Edentata Ã©tait polyphylÃ©tique, c'est-Ã -dire qu'il contenait des familles sans rapport entre elles et Ã©tait invalidÃ©e par la cladistique. Les oryctÃ©ropes et les pangolins occupent aujourd'hui chacun un ordre respectif, et un nouvel ordre fut Ã©rigÃ© pour regrouper les familles restantes (qui sont toutes apparentÃ©es). Le mot xÃ©narthres signifie "Ã©tranges articulations", et a Ã©tÃ© choisi Ã  cause de leurs articulations intervertÃ©brales inhabituelles chez les autres mammifÃ¨res euthÃ©riens.

La morphologie des xÃ©narthres suggÃ¨re gÃ©nÃ©ralement que les fourmiliers et les paresseux sont assez proches au sein des xÃ©narthres.

Le plus souvent, les xÃ©narthres ressemble Ã  des tatous.