

Fiche de totem : Ath na



Floches

Ext rieur : Gris clair

Int rieur : Brun fonc 

Classification

Sous-Embranchement : Vert br s

Classe : Aves

Ordre : Strigiformes

Famille : Strigid s

Caract ristiques

Taille : 20 cm

Poids : 200g

Long vit  : 9 ans

Port e :

Gestation :

Protection : Inconnu



Appel e  galement Chev che d'Atth na ou simplement Ath ne.

Chant : Le cri de la chev che d'Ath na est un "verro" retentissant et criard. On peut aussi entendre son chant, un miaulement net et clair. La femelle  met des sons plus haut-perch s et nasillards. Le cri d'alarme est perch  et aigu.

Habitat : L'Ath na vit dans des zones plates ou vallonn es de toutes sortes, les zones agricoles, les paysages avec des arbres dispers s, des terrains ouverts travers s de talus, murs de pierres ou pentes rocheuses. On les trouve aussi dans les vergers, les ruines, les villages, le semi-d sert ou le d sert.

Cette esp ce est r sidente dans les zones temp r es et chaudes de son territoire.

Elle fr quente plusieurs sortes d'habitats ouverts tels que les steppes, les semi-d serts pierreux, les zones cultiv es, les for ts ouvertes avec des arbres clairsem s, les ravins, les carri res,

En revanche, cette esp ce  vite la v g tation trop  paisse.  

Comportements : L'Ath na est active de jour comme de nuit, mais elle chasse plut t la nuit,   l'aube et au cr puscule. Pendant le jour, elle est souvent perch e   d couvert sur des pyl nes ou des arbres. Ses proies les plus fr quentes sont les insectes et les araign es, les souris et les campagnols.

Quand elle chasse, elle effectue un vol rapide et direct, et se laisse tomber sur sa proie pour la capturer. Elle l'emporte ensuite dans une cavit  d'arbre pour la d vorer. Elle a des serres puissantes, et est capable d'empoigner des petits mammif res et oiseaux de sa propre taille. Elle peut aussi voltiger sur place pour attraper des insectes.

L'Ath na peut rester pos e pendant des heures compl tement immobile.

Elle rejette de petites pelotes depuis son perchoir favori, dortoir ou nid. Ces pelotes ovales s'accumulent sur le sol, sous ces perchoirs.

Elle est souvent vue pos e, soit bien dress e sur ses pattes, soit accroupie sur les piquets, cl tures, fils, rochers ! Quand elle se sent menac e ou qu tmelle est excit e, elle reste debout bien droite et se balance en mouvements rapides.

Cette esp ce se nourrit surtout de petits mammif res et d'oiseaux, mais aussi d'amphibiens, reptiles et grands insectes. Elle consomme aussi des mati res v g tales telles qu'herbes, feuilles, petits fruits et baies.  

Elle chasse principalement au cr puscule et   l'aube, mais aussi pendant les premi res heures de la nuit. Elle chasse habituellement depuis un perchoir et fond sur sa proie en vol direct quand celle-ci est rep r e.

Elle peut aussi chasser sur le sol. Gr ce   ses pattes assez longues, elle est capable de courir facilement et de poursuivre ses proies.

L'Ath na est monogame et les liens du couple durent toute l'ann e et souvent plus longtemps.  

La parade typique du m le offrant de la nourriture   la femelle est fr quente, tandis que la femelle  met des petits cris comme les jeunes oiseaux. Pendant ces parades, le m le bouge habituellement les ailes et le corps avant de s'accoupler. Le lissage mutuel des plumes joue aussi un r le important pour renforcer les liens du couple. Les deux partenaires  mettent des cris tandis que le m le se rapproche de la femelle petit   petit. Le m le  tablit son territoire d but f vrier en lan ant son cri familier    goooeek   nuit et jour. La parade commence en mars, quand la femelle r pond aux appels du m le.



L'athéna est sédentaire dans son habitat, et son territoire est relativement petit. Selon les régions, les couples peuvent se trouver proches les uns des autres et on peut entendre des concerts de cris au crépuscule.

Vol : Elle a un vol très ondulant, avec de rapides battements alternés avec les ailes closes, sur de longues distances. Quand elle poursuit une proie, le vol est plus direct.

Nidification : Le nid de cette chevêche peut être situé sur le sol dans un terrier, ou dans un trou dans un arbre, dans la roche ou dans un immeuble. Le même site est utilisé année après année.

La femelle dépose 3 à 5 oeufs lisses et blancs vers fin avril. L'incubation démarre habituellement avec le premier oeuf pondu, mais parfois, la femelle attend que sa couvée soit complète. L'incubation dure environ 28 à 29 jours, assurée par la femelle qui est nourrie par le mâle. Les poussins sont nidicoles. Ils sont nourris par les deux parents, mais c'est le mâle qui produit la nourriture pendant les deux premières semaines pour la famille entière. Les jeunes quittent le nid au bout de 35 jours, et les parents les nourrissent encore pendant quelques temps. Ils deviennent indépendants au bout de 9 ou 10 semaines.

Régime : Elle se nourrit principalement d'invertébrés et de vers de terre, mais aussi de petits mammifères et d'oiseaux, ainsi que d'amphibiens.

Source : Oiseaux.net