

# Fiche de totem : Protée



## Floches

Extérieur : Jaune

Intérieur : Blanc

## Classification

Sous-Embranchement : Proteliniaie

Classe : Mammalia

Ordre : Carnivora

Famille : Canidés

## Caractéristiques

Taille : 85 à 105 cm, 40 à 50 cm

Poids : 8 à 12 kg

Longévité : 13 ans

Portée : 2 à 4

Gestation : 59 à 61 jours

Protection : Inconnu



Le protée est un mammifère de la famille hyaenidae et est la seule espèce du genre proteles et de la sous-famille proteliniae. C'est un animal farouche et nocturne, rarement observé dans la nature. Il se nourrit essentiellement de termites moissonneurs. Il semble repérer ses proies au son mais l'odeur exhalée par les termites soldats pour se défendre lui fournit certainement une aide complémentaire. Les termites sont lâchés par de rapides mouvements de sa longue langue, recouverte d'une salive collante.

Le comportement du protée est en relation avec sa dépendance aux termites. Pendant la plus grande partie de l'année, ses périodes d'activité sont calquées sur celles des termites moissonneurs, qui émergent le soir et la nuit car ne supportant pas la lumière directe du soleil à cause de leur faible pigmentation. Certains événements climatiques (arrivée de la saison des pluies, abaissement de la température dans l'hiver tempéré d'Afrique australe) semblent limiter leur activité et le protée trouve alors une solution de rechange avec le grand termite moissonneur (*Hodotermes mossambicus*), qui lui, supporte la lumière du soleil et se rencontre donc dans la journée. Le protée consomme à l'occasion des insectes autres que les termites ou les fourmis, voire de petits mammifères, des oisillons et des charognes mais il s'agit d'un prédateur mineur.

Étant donné le fait que les termites moissonneurs se déplacent en petites colonies denses isolées, les protées sont des chasseurs solitaires. Un couple occupe généralement un territoire de 1 à 2 km<sup>2</sup>, en compagnie de leur dernière progéniture. Les intrus sont repoussés jusqu'à 400 m et des combats sérieux peuvent éclater quand le visiteur est rattrapé, notamment lors de la saison des amours.

Lorsque la nourriture se fait abondante, le système territorial s'assouplit et plusieurs individus peuvent alors fourrager sur le même domaine sans conflits sérieux.

Excepté les rencontres agressives, le territoire est défendu par un système de marques (petites taches noires de 5 mm déposées sur les graminées par des glandes anales), renouvelées fréquemment (jusqu'à 120 marques en 2 heures). Une famille de protées possède de nombreux points sur son territoire une dizaine de tanières et autant de lieux de défécation, petites excavations creusées dans le sol.

Le terrier peut être celui d'un oryctrope ou d'un porc-épic ou un creux de rocher mais il s'agit le plus souvent d'une excavation que le protée a creusé lui-même ou terrier élargi de lièvre sauteur. Les protées utilisent seulement un ou deux terriers à la fois, mais éliminent fréquemment (au bout d'un mois à six semaines). Par temps frais, ils s'enfoncent dans la tanière pour y dormir quelques heures après le coucher du soleil, l'été ils se reposent la nuit à l'entrée du terrier, y descendant pendant la journée. Malgré le système territorial strict, de nombreux mâles circulent dans les territoires adjacents au leur, notamment pendant la période de reproduction.

